

۱۷ درصد زنان از طریق همسران شان به اچ‌آی‌وی مبتلا شده‌اند

Photo: [Sham Hardy](#)

رئیس اداره کل کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دلیل ابتلای ۱۷ درصد زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز را از طریق همسران آنان عنوان کرد.

به گزارش [ایرنا](#)، عباس صداقت روز سه‌شنبه ۰۱ آذر در نخستین جشنواره ترویج زایمان طبیعی گفت که شوهران این زنان این ویروس را از طریق رابطه جنسی محافظت نشده به همسر خود منتقل کرده‌اند.

تولد نوزادان مبتلا به اچ‌آی‌وی

صداقت به نوزادانی اشاره کرد که از مادران مبتلا به اچ‌آی‌وی / ایدز به دنیا می‌آیند. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت تاکید کرد: «کارشناسان و پزشکان در مواجهه با زنان باردار باید همواره احتمال ابتلای مادر به اچ‌آی‌وی را در نظر بگیرند و هنگام مراجعه او، آزمایش ایدز را لحاظ کنند.»

وی ادامه داد: «اگر مداخلات درست کارشناسانه برای مادر مبتلا وجود داشته باشد، احتمال اینکه عفونت به فرزندش منتقل شود به کمتر از ۲ درصد خواهد رسید.»

تفاوت آمار جهانی مبتلایان با آمار منطقه

رئیس اداره ایدز در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد که شمار مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز در جهان از سال ۰۰۰۲ کاهش یافته است؛ این در حالی است که این موضوع در سطح منطقه شمال آفریقا و مدیترانه شرقی متفاوت است.

علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیرا اعلام کرد که بیش از ۰۵ هزار مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز در کشور ناشناخته مانده‌اند و می‌توانند ویروس ایدز را گسترش دهند.

سیاری افزود: «در زمان حاضر تخمین زده می‌شود که بین ۰۸ تا ۰۹ هزار تن در کشور با اچ‌آی‌وی زندگی می‌کنند این در حالی است که فقط ۹۲ هزار و ۴۱۴ مبتلا در کشور شناسایی شده‌اند و بیش از ۰۵ هزار تن نیز ناشناخته‌اند.»